

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<p style="text-align: center;">Acciones preventivas</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Para <i>pacientes de alto riesgo</i>, con antecedentes hereditarios de cáncer de ovario y de mama</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Genotipificación de BRCA 1 y 2 (5 al 10%)</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Reactivos necesarios para la realización de Secuenciación Masiva en Paralelo de BRCA1 y BRCA2. Insumos necesarios para Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) para extensión a familiares en riesgo.</p> </div>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<div data-bbox="67 866 542 948" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Evaluación diagnóstica</div> <div data-bbox="266 1310 362 1406" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 100px;">A</div>	<div data-bbox="622 384 1095 651" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Ultrasonido abdomino-pélvico Ultrasonido transvaginal con método doppler Radiografía de tórax PA y lateral Tomografía abdomino-pélvica, simple y contrastada (medio de contraste hidrosoluble) </div> <div data-bbox="622 675 1095 1289" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Estudios de laboratorio y gabinete</p> Biometría hemática completa Pruebas de coagulación Química sanguínea (12 elementos) Pruebas de funcionamiento hepático Deshidrogenasa láctica, albúmina sérica Electrolitos séricos (Na, K, Cl, Ca) Alfa-feto proteína (inicial solamente) Fracción β de gonadotropina coriónica humana (inicial solamente) Marcadores tumorales Ca 125, Ca 19-9 Inhibina (inicial solamente) Antígeno carcinoembrionario (inicial solamente) Grupo y Rh Sanguíneo Ultrasonido mamario Mastografía </div> <div data-bbox="622 1313 1095 1497" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Solo en casos necesarios:</p> Tomografía de tórax 20% Panendoscopia 30% Colonoscopia 30% Gammagrama óseo 2% </div>	<div data-bbox="1162 1358 1637 1449" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 100px;">Anestesia general y/o mixta</div>	<div data-bbox="1697 400 2150 624" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Equipo de ultrasonido y transductores adecuados Equipo de Rayos X y placas Tomógrafo Medios de contraste </div> <div data-bbox="1697 831 2150 1150" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 100px;"> Laboratorio y reactivos específicos para cada prueba Equipo de ultrasonido y transductores adecuados Mastógrafo Medios de contraste Tomógrafo y placas Colonoscopia Endoscopia </div> <div data-bbox="1697 1310 2150 1497" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 100px;"> Laboratorio de histopatología, inmunohistoquímica Materiales y reactivos de patología para transoperatorio y definitivo Quirófano </div>


Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<p style="text-align: center;">A</p> <p><i>Laparoscopia diagnóstica, conversión a laparoscopia terapéutica</i></p>	<p>Confirmación diagnóstica: Laparotomía exploradora (no realizarse en caso de irresecabilidad¹) y/o Laparoscopia o Biopsia dirigida por tomografía o ultrasonido o Citología de líquido de ascitis</p> <p>4 variantes quirúrgicas: Toма de biopsia Lavado peritoneal Estudio transoperatorio Evaluación de resecabilidad</p>	<p>Anestesia general, mixta o local dependiendo caso</p> <p>Polietilenglicol 105 g, 2 sobres</p>	<p>Torre laparoscópica Kit de instrumentos de laparoscopia (trocar de 0.5 cm, 2 trocares de 1 cm, aguja de Verres)</p>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
	<p>Valoración prequirúrgica Valoración cardiológica(en pacientes mayores de 40 años y factores de riesgo) Valoración anestésica</p> <p>Cirugía Rutina de Ovario: Histerectomía total abdominal Salpingooferectomía BILATERAL Omentectomía Apendicectomía Linfadenectomía pélvica Linfadenectomía para-aórtica o muestreo para-aórtico Lavado peritoneal Biopsias de correderas parietocólicas, piso pélvico y cúpulas diafragmáticas Estudio histopatológico transoperatorio Resección intestinal</p> <p>Colocación de catéter puerto</p>	<p>Anestesia general</p> <p>Terapia de soporte: Analgesia Profilaxis antibiótica Profilaxis transfusional Profilaxis antitrombótica</p>	<p>Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos necesarios Equipo, materiales y reactivos para estudio histopatológico e inmunohistoquímica Quirófano Engrapadoras lineales, curvas y circulares Generador de energía para energía bipolar para sellado de vaso (opcional) Kit de trocares para laparoscopia Cartuchos para engrapadora lineal Agente hemostático absorbible Aguja de radiofrecuencia (solo casos indicados, 2%) Bolsa y placa para colostomía de aro flotante Pasta adhesiva para colostomía Sistema de drenaje de silicona acanalado Catéter puerto Aguja para catéter puerto Pinzas para laparoscopia Gasper Sonda Foley Sonda Nellaton</p>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<div data-bbox="264 421 362 512" style="text-align: center;"> <p>B</p> </div> <div data-bbox="78 815 555 1198" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">Cirugía de intervalo</p> <p>Pacientes inicialmente inoperables quienes recibirán quimioterapia de manera inicial (neoadyuvante) y en el 3er o 4to ciclo se valorará si es candidata a cirugía en base a la respuesta por clínica, radiológica y marcadores tumorales.</p> </div>	<div data-bbox="622 879 1099 1187" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Estudios de laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Biometría hemática completa Pruebas de coagulación Química sanguínea (12 elementos) Pruebas de funcionamiento hepático Albúmina sérica </div>	<div data-bbox="1160 762 1637 1107" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Previo a cirugía:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polietilenglicol 105 g, 2 sobres <p>Anestesia general</p> <p>Terapia de soporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analgesia Profilaxis antibiótica Profilaxis transfusional Profilaxis antitrombótica </div>	<div data-bbox="1697 491 2175 1315" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos necesarios Equipo, materiales y reactivos para estudio histopatológico e inmunohistoquímica Quirófano Engrapadoras lineales, curvas y circulares Generador de energía para energía bipolar para sellado de vaso (opcional) Kit de trocares para laparoscopia Cartuchos para engrapadora lineal Generador de energía para energía bipolar para sellado de vaso (opcional) Agujas de radiofrecuencia (solo casos indicados, 2%) Agente hemostático absorbible Bolsa y placa para colostomía de aro flotante Pasta adhesiva para colostomía Sistema de drenaje de silicona acanalado Catéter puerto Aguja para catéter puerto Pinzas para laparoscopia Gasper Sonda Foley Sonda Nellaton </div>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<div data-bbox="264 421 362 512" style="text-align: center;">B</div> <div data-bbox="80 724 555 1107" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">HIPEC</p> <p>(Peritonectomía más quimioterapia con hipertermia intraoperatoria, sólo en casos indicados 3)</p> <p>Pacientes con histología mucinosa, durante cirugía primaria o recurrente. Quirófano 12 hrs.</p> </div>	<div data-bbox="622 879 1097 959" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Citorreducción Peritonectomía</p> </div>	<div data-bbox="1162 592 1637 1347" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Premedicación para HIPEC: Dexametasona 16 mg IV c/12 hrs Palonosetrón 0.25 mg IV, DU Omeprazol 40 mg IV c/24 hrs</p> <p>Quimioterapia para aplicación intraperitoneal: Mitomicina C 1 15 mg Cisplatino 120 mg</p> <p>Quimioterapia subsecuente: Oxaliplatino 130 mg/m² cada 21 días por 8 ciclos Capecitabina 1 gr/m² c/12 hrs, días 1-14 cada 21 días por 8 ciclos</p> <p>Terapia de soporte: Analgesia Profilaxis antibiótica Profilaxis transfusional Profilaxis antitrombótica</p> </div>	<div data-bbox="1695 660 2172 1187" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Máquina de perfusión de 60 a 90 minutos (subrogada) Drenajes Jackson-Pratt (4) Engrapadoras lineales, curvas y circulares Agente hemostático absorbible Sistema de drenaje de silicona acanalado Bolsa y placa para colostomía de aro flotante Cartuchos para engrapadora lineal Equipo necesario para histopatología Termómetros Ta intraperitoneales (4) Bolsas de protección de pared abdominal Sonda Foley Sonda Nellaton</p> </div>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<div data-bbox="264 421 362 512" style="text-align: center;"> <p>B</p> </div> <div data-bbox="78 722 555 1107" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">Cirugía Citorreductora Tardía</p> <p>Se aplica para pacientes a las cuales no se les pudo practicar una cirugía de intervalo, se realiza al término de 6 ciclos. Quirófano 6 hrs.</p> </div>	<div data-bbox="622 571 1099 1324" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Estudios de laboratorio: Biometría hemática completa Pruebas de coagulación Química sanguínea (12 elementos) Pruebas de funcionamiento hepático Albúmina sérica</p> <p>Cirugía Citorreductora: Histerectomía total abdominal Salpingooforectomía BILATERAL Omentectomía Apendicectomía Linfadenectomía pélvica Linfadenectomía para-aórtica o muestreo para-aórtico Lavado peritoneal Biopsias de correderas, parietocólicas, piso pélvico y cirugías diafragmáticas Estudio histopatológico transoperatorio Resección intestinal</p> <p>Colocación de catéter puerto</p> </div>	<div data-bbox="1167 719 1644 1165" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Previo a cirugía Polietileglicol 105 g, 2 sobres</p> <p>Bloqueo epidural</p> <p>Anestesia general</p> <p>Terapia de soporte: Analgesia Profilaxis antibiótica Profilaxis transfusional Profilaxis antitrombótica</p> </div>	<div data-bbox="1697 491 2175 1313" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos necesarios Equipo, materiales y reactivos para estudio histopatológico e inmunohistoquímica Quirófano Engrapadoras lineales, curvas y circulares Generador de energía para energía bipolar para sellado de vaso (opcional) Kit de trocares para laparoscopia Cartuchos para engrapadora lineal Agente hemostático absorbible Aguja de radiofrecuencia (solo casos indicados, 2%) Bolsa y placa para colostomía de aro flotante Pasta adhesiva para colostomía Sistema de drenaje de silicona acanalado Catéter puerto Aguja para catéter puerto Pinzas para laparoscopia Gasper Sonda Foley Sonda Nellaton</p> </div>


Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<div data-bbox="273 421 371 512" style="text-align: center;">B</div> <div data-bbox="89 724 562 1107" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">Cirugía Citorreductora Secundaria</p> <p>Aplicable para tumores demostrables y resecables que ocluyan el tubo digestivo (periodo mayor a 6 meses posterior al término de la quimioterapia). No aplicable a carcinomatosis. Quirófano de 4 a 6 hrs.</p> </div>	<div data-bbox="629 844 1102 1015" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Detumorización (resección de todo tumor visible y posible)</p> <p>Colocación de catéter puerto</p> </div>	<div data-bbox="1169 740 1641 1118" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Previo a cirugía</p> <p>Polietileglicol 105 g, 2 sobres</p> <p>Bloqueo epidural</p> <p>Anestesia general</p> <p>Terapia de soporte:</p> <p>Analgesia</p> <p>Profilaxis antibiótica</p> <p>Profilaxis transfusional</p> <p>Profilaxis antitrombótica</p> </div>	<div data-bbox="1697 491 2175 1313" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos necesarios</p> <p>Equipo, materiales y reactivos para estudio histopatológico e inmunohistoquímica</p> <p>Quirófano</p> <p>Engrapadoras lineales, curvas y circulares</p> <p>Generador de energía para energía bipolar para sellado de vaso (opcional)</p> <p>Kit de trocares para laparoscopia</p> <p>Cartuchos para engrapadora lineal</p> <p>Agente hemostático absorbible</p> <p>Agujas de radiofrecuencia (solo casos indicados, 2%)</p> <p>Bolsa y placa para colostomía de aro flotante</p> <p>Pasta adhesiva para colostomía</p> <p>Sistema de drenaje de silicona acanalado</p> <p>Catéter puerto</p> <p>Aguja para catéter puerto</p> <p>Pinzas para laparoscopia Gasper</p> <p>Sonda Foley</p> <p>Sonda Nellaton</p> </div>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
 <p data-bbox="309 443 331 466">B</p> <p data-bbox="152 938 481 960"><i>Terapia de soporte quirúrgica</i></p>		<p data-bbox="1167 405 1285 427">Analgésia:</p> <p data-bbox="1167 437 1637 491">Ketorolaco 10mg VO c/8hrs o 10mg IV c/8hrs</p> <p data-bbox="1167 501 1637 555">Tramadol 50mg VO c/8hrs o 100mg IV c/12hrs</p> <p data-bbox="1167 564 1509 587">Metamizol sódico 1gr IV c/8hrs</p> <p data-bbox="1167 596 1451 619">Paracetamol 1gr IV c/8hrs</p> <p data-bbox="1167 628 1630 651">Clonixinato de lisina 100mg IV o VO c/8hrs</p> <p data-bbox="1167 660 1637 715">Bupremorfina parche de 20mg o 30mg c/48 a 72 hrs</p> <p data-bbox="1167 759 1608 782">Bomba de infusión analgésica epidural:</p> <p data-bbox="1167 791 1621 813">Fentanilo 2µg/Kg/hr en infusión de 24 hrs</p> <p data-bbox="1167 823 1637 909">Bupivacaina 75mg/kg más Morfina 2mg/kg diluidos en 60cc de solución fisiológica, en infusión de 24hrs.</p> <p data-bbox="1167 954 1312 976">Antibióticos:</p> <p data-bbox="1167 986 1563 1008">Ceftriaxona 1gr IV c/12hrs por 7 días</p> <p data-bbox="1167 1018 1608 1040">Ciprofloxacina 400mg c/ 12hrs por 7 días</p> <p data-bbox="1167 1050 1496 1072">Cefuroxima 750 mg IV c/12hrs</p> <p data-bbox="1167 1082 1559 1104">Metronidazol 500mg IV o VO c/8hrs</p> <p data-bbox="1167 1114 1469 1136">Clindamicina 300mg c/8hrs</p> <p data-bbox="1167 1181 1523 1203">Protectores de mucosa gástrica:</p> <p data-bbox="1167 1212 1473 1235">Omeprazol 40mg IV c/24hrs</p> <p data-bbox="1167 1244 1482 1267">Pantoprazol 40mg IV c/24hrs</p> <p data-bbox="1167 1311 1326 1334">Antieméticos:</p> <p data-bbox="1167 1343 1527 1366">Ondansetrón 8mg IV o VO c/8hrs</p> <p data-bbox="1167 1410 1361 1433">Antitrombóticos:</p> <p data-bbox="1167 1442 1581 1465">Enoxaparina 40mg o 60mg SC c/24hrs</p>	

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos
Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Quimioterapia adyuvante</p> <p>Manejo: <i>Etapa Clínica IA o B; G1</i></p> <p>Manejo: <i>Etapas Clínicas IA G2, IB G2 IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC y IV</i></p> <p style="text-align: center;">D</p>	<p>Vigilancia CA-125 c/2 meses x 2 años Tele de tórax PA semestral x 2 años Tomografía axial computada abdomino-pélvica anual x 2 años Mastografía y ultrasonido mamario</p> <p>Colocación de catéter puerto</p> <p>Antes de cada ciclo de quimioterapia:</p> <p>Estudios de laboratorio Biometría hemática completa. Química sanguínea completa (4 elementos). Marcador tumoral CA-125 y Ca 19-9 Pruebas de funcionamiento hepático</p>	<p style="text-align: center;">Sedación</p> <p style="text-align: center;">Pre medicación para quimioterapia</p>	<p>Tomógrafo Equipo para rayos X Mastógrafo Ultrasonido</p> <p>Catéter puerto Agujas anguladas para catéter puerto</p> <p>Material, soluciones y equipos necesarios para preparación y administración de quimioterapia</p>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<p style="text-align: center;">D</p> <p style="text-align: center;">1a Línea</p> <p>Población con riesgo estándar</p> <p>Población con alto riesgo Pacientes con EC III, IV con citorreducción subóptima</p>	<p>Quimioterapia adyuvante Carboplatino AUC 5-6 + Paclitaxel 175mg/m² cada 21 días por 6 ciclos</p> <p>Quimioterapia adyuvante Carboplatino AUC 5-6 + Paclitaxel 175mg/m² por 6 ciclos cada 21 días + Bevacizumab 7.5 mg /kg cada 21 días por 12 meses a partir del segundo ciclo</p>	<p>Pre medicación para quimioterapia</p> <p>Pre medicación para quimioterapia</p>	<p>Material, soluciones y equipos necesarios para preparación y administración de quimioterapia</p> <p>Material, soluciones y equipos necesarios para preparación y administración de quimioterapia</p>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<p style="text-align: center;">D</p> <p style="text-align: center;">2a Línea A falla o progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable</p> <p style="text-align: center;">Menos de 6 meses</p> <p style="text-align: center;">6 meses en adelante</p>	<p>Paclitaxel 80mg/m² semanal más Bevacizumab 7.5 mg /kg cada 21 días</p> <p>Gemcitabina 1gr/m² día 1 y 8 cada 3 semanas</p> <p>Carboplatino AUC 5-6 + Paclitaxel 175mg/m² cada 21 días por 6 ciclos o Carboplatino AUC 5-6 cada 21 días + Paclitaxel 80mg/m² semanal por 6 ciclos o Carboplatino AUC 4 cada 21 días + Gemcitabina 1gr/m² día 1 y 8 cada 3 semanas + Bevacizumab 7.5 mg /kg cada 21 días.</p>	<p>Pre medicación para quimioterapia</p> <p>Pre medicación para quimioterapia</p>	<p>Material, soluciones y equipos necesarios para preparación y administración de quimioterapia</p> <p>Material, soluciones y equipos necesarios para preparación y administración de quimioterapia</p>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">D</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px; text-align: center;"> <p>3a Línea</p> <p>A falla o progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px; text-align: center;"> <p>Terapia de soporte para quimioterapia</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Gemcitabina 1gr/m2 día 1 y 8 cada 3 semanas</p> <p>Tamoxifeno 20 mg VO c/24 hrs</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px; text-align: center;"> <p>Premedicación para quimioterapia:</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Pre medicación para quimioterapia</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Ondansetrón 24 mg /día por 3 días o Granisetron 3 mg /día por 3 días o Palonosetrón 0.25 mg por ciclo y Aprepitant 125mg y80 mg comprimidos una caja por ciclo (3)</p> <p>Dexametasona 16 mg/ día IV, en cada ciclo de quimioterapia Prednisona oral 3 tabletas de 20mg por 4 días Ranitidina 50mg IV previo a cada ciclo de quimioterapia Difenhidramina 50mg IV DU, previo a cada ciclo de quimioterapia Filgastrim 300 µg/día por 5 días, por razón necesaria Aprepitant tab 125-80-80mg 1c/24 hrs *3 días Gabapentina 300 mg c/8hrs ó Pregabalina 75mg c/12hrs</p> <p>Citalopram 10mg c/24hrs (sólo en casos indicados) Picosulfato sódico de 5 a 10 mg c/24 hrs por 4 meses</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Material, soluciones y equipos necesarios para preparación y administración de quimioterapia</p> </div>

Categoría I: Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Adultos

Enfermedad CIE.10: C56 Tumor maligno de Ovario (Neoplasias de células epiteliales)

Etapa de tratamiento	Intervenciones	Medicamentos	Equipamiento y otros insumos
<p>Programa de vigilancia</p> <p>1er año</p> <p>2do al 5to año</p> <p>Sospecha de recaída que no se pueda aclarar con métodos convencionales (tomografía)</p>	<p>Marcadores tumorales c/2 meses Radiografía de tórax PA Tomografía axial computarizada abdomino-pélvica simple y contrastada Mastografía y ultrasonido mamario (para pacientes con cáncer de mama y ovario hereditario)⁴</p> <p>Marcadores tumorales c/4 meses Radiografía de tórax PA (anual) Tomografía axial computarizada abdomino-pélvica simple y contrastada (anual)</p> <p>Tomografía por emisión de positrones (PET-CT)</p>		<p>Reactivos, equipos y material de laboratorio Equipo Rx convencional Tomógrafo Medios de contraste Ultrasonido Mastógrafo</p> <p>Reactivos, equipos y material de laboratorio Equipo Rx convencional Tomógrafo Medios de contraste Ultrasonido Mastógrafo</p> <p>PET (subrogado)</p>

1 Ascitis masiva: perímetro abdominal mayor de 100cm, estado funcional de acuerdo a valores de albúmina: albúmina sérica ≤ 3, ECOG ≥2, enfermedad extensa en abdomen superior: implantes en cola de páncreas o bazo, metástasis parenquimatosas hepáticas o pulmonares, implantes mesentéricos, invasión de los vasos mesentéricos, adenomegalias por arriba de los vasos renales, amplia invasión a la serosa que requiere resección intestinal, cirujano sin entrenamiento oncológico.

2 Todas las cirugías de cáncer de ovario deben ser realizadas por cirujano oncológico o ginecólogo oncológico

3 Sólo centros de referencia que cuenten con los insumos y personal capacitado.

4 a) ≥1 cáncer de mama y ≥1 cáncer de ovario a cualquier edad, aun sin otros antecedentes, b) ≥2 casos de cáncer de ovario, a cualquier edad, aun sin otros antecedentes, c) ≥1 caso de cáncer de mama en varón y ≥1 caso de cáncer de ovario y/o mama, d) ≥3 familiares con cáncer de mama, 2 de ellas menores a 50 años; e) ≥3 familiares con cáncer de mama a cualquier edad; sin antecedentes familiares de cáncer de ovario y cáncer de mama en varón; f) 2 familiares con cáncer de Mama, ambas antes de los 50 años; sin antecedentes de cáncer de ovario o cáncer de mama en varón; g) 2 familiares con cáncer de mama, 1 antes de los 50 años; sin antecedentes de cáncer de mama en varón; h) 1 caso de cáncer de mama bilateral, el 1er diagnóstico antes de los 50 años, aun sin otro antecedente; i) 1 caso de cáncer de mama antes de los 36 años, aun sin otro antecedente.